

УПЧУНУН ЗЫЯНДАРЫ

- ✓ Бала упчуну дайыма соро берип чарчап, эмчекти эмгенден баш тартышы же аз эле убакыт сорушу мүмкүн.
- ✓ Бала эмчектин үрпүн “упчу менен алмаштырып”, эмизгенде оозун чоң ачпай калат, үрптү ареоласыз эле соруп жетишерлик сүт чыкпай, тойбой калышы мүмкүн, мунун жыйынтыгында эмчектен баш тартып, упчуну талап кылат.
- ✓ Упчу баланын тиштөөсүн өзгөртөт, бул чоңойгондо анын тышкы көрүнүшүнө таасирин тийгизиши мүмкүн: жаактары туура эмес өсүп, тиштери кыйшык жана оорулуу болуп калышы ыктымал.
- ✓ Упчу баланын үн органдарынын туура калыптануусун бузат, жыйынтыгында сүйлөө кемчиликтерине алып келет – дикция начар өөрчүйт жана сөздөрдү так айта албай калат.
- ✓ Оозуна дайыма бир нерсе салып жана соруп жүргүсү келгендиктен балада зыяндуу адаттар пайда болушу мүмкүн.
- ✓ Кандай гана упчу болбосун инфекциялардын пайда болуусу үчүн тобокелчиликтин фактору болушу ыктымал.
- ✓ Упчулар резина, силикон жана латекстен жасалат. Алар баланын ден соолугуна зыянын тийгизиши мүмкүн.
- ✓ Бала өзүнүн соруу рефлексин энесинин эмчегин соруу жана аны менен жылуу байланышта болуу аркылуу канааттандырууга муктаж, упчу анын ордун алмаштыра албайт.
- ✓ Упчу баланы түнт кылат, анын айлана-чөйрөгө болгон кызыгуусун азайтат.



БӨТӨЛКӨДӨН ТАМАКТАНДЫРУУНУН ЗЫЯНДАРЫ

- ✓ Балага 6 айына чейин бөтөлкөдөн кошумча тамак берүү энесинин сүтүнүн иштелип чыгышынын төмөндөөсүнө алып келет.
- ✓ Балага 6 айдан кийин бөтөлкөдөн берилген кошумча тамак ага тамак-аш заттарынын жана энергиянын жетишерлик өлчөмүн бербейт, мындан улам ал өнүгүүдө артта калышы мүмкүн.
- ✓ Бөтөлкөдөн тамактандыруу баланы энеси менен байланышта болуу жана мамиле түзүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат, бул баланы коопсуздукта болуу жана сүйүү сезимдерине бөгөт коёт.
- ✓ Бөтөлкө жакшы жуулбайт жана аны стерилдөө да оңой эмес. Бөтөлкөнүн ичинде калган тамактын калдыктарында бактериялар пайда болушу жана балдар үчүн уулануунун булагы болушу мүмкүн.

